

Tertium fœ-
eus involucrũ.

men inter difficandam promptè occurrunt, quòd hæc membrana præce-
branis & tenuissima fit, & omnis prorsus adipis expers. Vnde etiam ipsi
quasdam nationes non integranter exciscata uelicæ modo feruatur, atque
res in masculis galea, in feminis uitta, apud Italos uerò indusium fuisse
in hoc errantes, quòd omnibus pueris hanc membranam communem in
Quod obstetricum inscitia fieri uideo, quæ interdum, & ut plurimum ter-
mul cum secundo à fecu abstrahunt, tunc illam suam caniliam non obso-
luto uerò quum extimul in uolucrum utero adhuc in partu pertinacius ad-
tus antea prodit, tunc intumulus ipsius in uolucrum capiti ipsius aut crur-
etum absq; secundo in uolucro prodit: id quæ tunc mulieres religiosæ, & r-
asseruant, neq; ab his modò, uerum & ab occultis philosophis summo pe-
ritum pariter & intumulus & secundum possent semper matres æquæ pueror-
rillimam meam matrem fecisse uideo) reponere, si extimulus in uolucrum
substantiam à secundo in uolucro deradi mox curent, & ablatus postm-
feno leuiter opplerent, uelicarum quæ modo exciscarent. Putauerim eni-
si grandiam pueri mater illius offerret in uolucra, quàm quod eas simul
sodore, & qui profuit tunc atro sanguine in cloacas rejci, aut in terram
cæteris uiuiparis animalibus ferè sit innatum, ut simul omnia quæ fecerunt
rent, ac deglutiant, id quod in parturientibus canibus non iniucundè a-
ui. Porro quæ uenarum & arteriarum in umbilicum pertinentium sit
priusquam in iecur absmitur, in canibus ramus in mesenterij centrum per
tem secundum uelicæ fundi latera deorsum prorepere, atque in humili-
magnæ inseri, quos diffundit post magnam supra sacri ossis initium diuisi-
pacio autem hæc omnia ad amussim dissectione indagaturus sis, ubi man-
absoluo, ordinatim subiungam.

MAMILLARVM fabricam non aliter delineare li-
tro latere uigefimæ quintæ figuræ eam exprimere conati fuimus.

4 Non cōti
nētur inter
A, B, C, D 2
σ 14 figu.

b; muscul.
tab. Δ.

MAMILLAE etiam si peritonæo nulla ex parte^a am-
men factum ubi is in lucem prodijt, alant, atq; in orga-
ni subservientium numerum recensenda sint, hoc quo-
bricam opportunè prosequemur. Mamillarum itaq;
conspicius est: super pectus enim ad ossis pectoris
ti inferiori brachium pectori admoventis^b musculi su-
ut figura admodū variant, sic quoq; parem non semper
Ampliores enim mamillæ latiori firmantur basi, propendulæ uerò ac flacce-
declinant: & quibusdam mulieribus uicinijs ad pectoris medium inuicem
dam autem (quod & pulcherrimum ducitur) inuicem recedunt, thoracis
appropinquant. Forma illis penè propria, femiglobum reced: quippe exte-
baeq; sunt, papillæ (quæ Græcis *θήλα* appellatur) insit processus obinentes
sterius, quæ pectus spectant, leuiter admodum sinuantur, secundum pectori
amplæ basi commissæ. Mamillarum moles quum à brachium pectori addu-
fecdit, quæ illæ potissimum dependent, ampliores quàm in medio ductu eua-
feminis simul in basi, & in ipsarum extremitate ampliores ob coincidentem
tiam uiuantur. Porro substantia qua constant glandulosa est, multo adipe al-
paucisq; admodum arterijs & neruis intertexta. Nerui quidem semper ije-
tingunt, ac sibi perpetuò similes sunt: uenæ autem & arteriæ crassitie & con-
modum pro mamillarum mole, & quo tunc funguntur munere differunt. In
ma, substantia, multitudine & situ multo maior singulis temporibus est diffu-
que multis nullæ ac per quàm paucissimæ eademq; aridæ sunt glandulæ, u-
puellis. Alijs autem frequenter exuberantesq; adfunt, duritiæ, & mollitiæ, a-
luenculæ enim quibus iam mamillæ in molem attolluntur, generationisq;
glandularum obinent copiam, sed inuicem compactarum & durarum, nu-